Seconda Università degli Studi di Napoli
Facoltà di Medicina e Chirurgia
I Clinica Ortopedica e Traumatologica

*L'impianto combinato di protesi
femoro-rotulea e monocompartimentale
nel trattamento della gonartrosi*

Prof. F. Zanchini

Congresso SOTIMI

La mininvasività
nella

Chirurgia Protesica del Ginocchio

*"perché impiantare una protesi F-R + MC
e non una protesi totale..?"*

..e quando" ?

Mininvasività nella PTA

*risparmio di
patrimonio osseo*

maggiore rispetto dei tessuti molli

Mininvasività del ginocchio

malposizionamento - difetti rotazionali - instabilità - ecc.

Trattamento chirurgico limitato all'effettiva patologia

".. Excision of intact femoral and tibial articular condyles, the menisci and the cruciate ligaments may, in the future, be looked back on as being akin to vandalism.."

"..la resezione dei condili femorali e tibiali sani, dei legamenti crociati e dei menischi, potrebbe, in futuro, essere visto come un atto di vandalismo.."

VANTAGGI

- CONSERVAZIONE LCA LCP
- RISPARMIO DEL COMPARTIMENTO F-T SANO
- RISPETTO DELLA FISIOLOGIA ARTICOLARE
- CHIRURGIA MININVASIVA SENZA RISCHIARE MALP. E INS.
- MINORI PERDITE EMATICHE
- MINORE DOLORE POST-OPERATORIO
- ROM COMPLETO
- MINORI RISCHI DI INFEZIONE E TROMBOEMBOLIA
- SENSAZIONE SOGGETTIVA DI GINOCCHIO PROPRIO
- FUTURA REVISIONE CON PTG PRIMARIA

SVANTAGGI

- *strumentari ancora poco affidabili per la riproducibilità*
- *maggiori difficoltà di tecnica chirurgica*
- *manca di follow-up a medio e lungo termine*

letteratura

CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH
Number 436, pp. 20-29
© 2005 Lippincott Williams & Wilkins

Biomechanics of Patellofemoral Joint Prostheses

Andrew A. Amis, DSc; Wongwit Senavongse, PhD; and Peter Darcy, MRCS

Follow-up

5-17 anni

Buoni risultati

58-86 %

	PFA	follow-up	Buoni risultati	PTG
Arciero	36	5.3	72 %	?
Argenson	66	5.2	84 , 8 %	15 , 9 %
Arnbjornsson	113	7	75 %	?
Aubriot/Witvoet	98	5	81 , 6 %	11 , 2 %
Blanzina	53	2	81%	9 , 4 %
Cartier	75	4	90 %	0%
Krajca	18	5.8	94 %	0%
Kooijman H.J.	56	17	86 %	14%
Tauro B	62	7.5	45%	28%
Argenson	66	16,2	58 %	20%

cause degli insuccessi

Patellofemoral Arthroplasty An Update

Jean-Noël A. Argenson, MD; Xavier Flecher, MD; Sebastien Parratte, MD; and
Jean-Manuel Aubaniac, MD

**RICHARDS II-III – LUBINUS - CFS WRIGHT
MEDINOV AUTOCENTRIC - DE PUY WARSHAW**

(inlay)

- INSTABILITA' FEMORO-ROTULEA
- EVOLUZIONE DELL'ARTROSI F-T
- ERRORI DI TECNICA
- RIGIDITA'
- LOOSENING
- INFEZIONE

Instabilità femoro-rotulea

Errori di tecnica

*Evoluzione
artrosi f-t*

rigidità

infezione

Aseptic loosening

Miscellaneous

Instabilità femoro-rotulea

AVON - HERMES - VANGARD (onlay) →

"..un corretto orientamento della troclea protesica è sufficiente, nella maggior parte dei casi, a ricentrare l'apparato estensore, richiedendo raramente tempi chirurgici accessori, essendo sufficiente un lateral release.."

Romagnoli S Arch Ortop e Reum 2006

Evoluzione dell'OA

*"..l'artrosi femoro-tibiale influenza
i cattivi risultati della PFA.."*

Insall J - Aglietti P JBJs Am 1980

*Asociazione protesi femoro-rotulea
e protesi monocompartimentale m/l*

ERRRORI DI TECNICA

spessore della rotula
ed inclinazione della resezione

evitare il gradino con i condili

accurata rimozione
degli osteofiti laterali

medializzazione del polietilene

evitare il "notching"
ed il "catching"

"no-thumb"

scrupolosa tecnica
di cementazione

FILMATO

INDICAZIONI

- INTEGRITA' DEL COMPARTIMENTO LATERALE
- DEVIAZIONI ASSIALI VARO-VALGO < 15°
- INTEGRITA' DEI LEGAMENTI CROCIATI
- CONTRATTURA IN FLESSIONE < 10°

CONTROINDICAZIONI

- ARTRITE REUMATOIDE
- ROTULA BASSA
- DEGENERAZIONE DEL COMARTIMENTO LATERALE
- DOLORE ANTERIORE IN ASSENZA DI EVIDENTI SEGNI DEGENERATIVI
- OBESITA'
- VARISMO EPIFISARIO > 10°

CONCLUSIONI

L'associazione dei due impianti può anche essere effettuata in tempi successivi

147 PFA

AVON F.U. 4 anni

96 % soddisfacente

Ackroyd CE JBJS Br 2003

studi a lungo termine che
ne dimostrino la affidabilità

grazie
dell'attenzione